














	Coleta de ovos	Fumigação	Sala de ovos	Transporte										
Higiene dos Ovos	 <p>O risco de contaminação é maior nos primeiros 3 minutos após a postura dos ovos</p>	<p>Fumigar com formaldeído até 1,5hr após a coleta dos ovos</p> <ul style="list-style-type: none"> Aquecer 10 g de paraformaldeído ou 43 ml formalina (37,5%) e 21 g permanganato de potássio por m³ de espaço Temperatura mínima de 24 °C com um RH de 65% Ligar os ventiladores de circulação de ar para garantir distribuição uniforme Seguir a legislação local e todas medidas de segurança para as pessoas 	<ul style="list-style-type: none"> * Manter os ovos sempre secos * Garantir a ventilação e umidificação sem molhar ou gotejar sobre os ovos * Assegurar equipamentos, piso, paredes e teto totalmente limpos e desinfetados 	<ul style="list-style-type: none"> * Prevenir a condensação em qualquer fase do processo * Garantir a cadeia de frio desde o aviário, sala de ovos na granja, transporte e sala de ovos no incubatório, sem variações e com queda gradativa da temperatura 										
	<p>Manter as bocas dos ninhos limpas: remover o material sujo dos ninhos e as fezes diariamente. Limpar/higienizar as esteiras dos ninhos mecânicos todas as semanas</p> 					 <p>Limpar e desinfetar a sala de ovos sempre que estiver vazia ou 2 a 3 vezes por semana</p>	 <p>Garantir a limpeza e desinfecção do caminhão antes dos ovos serem carregados</p>							
Manuseio dos Ovos	 <p>Os ovos devem ser coletados no mínimo 6 vezes por dia</p>	<p>Usar bandejas de plástico para a fumigação, permitindo que o ar com formoldeído circule completamente ao redor dos ovos</p> 	<p>Armazenar ovos até 4 horas após a coleta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Idade dos ovos</th> <th>Temperatura de armazenamento</th> <th>Umidade relativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-7 dias</td> <td>18 °C</td> <td rowspan="3">75-80%</td> </tr> <tr> <td>8-13 dias</td> <td>12-15 °C</td> </tr> <tr> <td>> 13 dias</td> <td>12 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Idade dos ovos	Temperatura de armazenamento	Umidade relativa	0-7 dias	18 °C	75-80%	8-13 dias	12-15 °C	> 13 dias	12 °C	<p>Manusear os ovos cuidadosamente desde o aviário, transporte interno na granja, sala de ovos, transporte até o incubatório e dentro do incubatório</p> 
	Idade dos ovos		Temperatura de armazenamento	Umidade relativa										
0-7 dias	18 °C	75-80%												
8-13 dias	12-15 °C													
> 13 dias	12 °C													
 <p>Manusear os ovos com cuidado para evitar rachaduras durante a coleta</p>	 <p>Garantir ovos resfriados abaixo do zero fisiológico (24 °C) antes de embalar em caixas</p>	 <p>Abastecer os carrinhos de baixo para cima</p>												